

ИППП КАК ФАКТОР РИСКА



ДЕМОГРАФИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

1 МЛН СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ ИНФЕКЦИЯМИ, ПЕРЕДАВАЕМЫМИ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ (ИППП) КАЖДЫЙ ДЕНЬ В МИРЕ

Излечимы, но приводят к бесплодию

- сифилис
- гонорея
- хламидиоз
- трихомониаз

Нельзя излечить

- Вирус простого герпеса (ВПГ, или герпес)
- Вирус папилломы человека (ВПЧ)

Могут привести к смерти

- Гепатит В
- ВИЧ



У ПАРТНЕРА МОЖЕТ БЫТЬ МНОГО ПРИЧИН ПРОМОЛЧАТЬ О ТОМ, ЧТО У НЕГО ИППП:

- Не знает о том, что болеет
- Не хочет тебя потерять
- Боится осуждения и огласки
- Боится, что раскроется его измена
- Ему/ей всё равно на тебя

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ – ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАЖДОГО!



ПРЕЗЕРВАТИВЫ НЕ ДАЮТ 100% ГАРАНТИИ ЗАЩИТЫ

Презервативы являются одним из самых эффективных методов защиты от нежелательной беременности и ИППП, включая ВИЧ, но и они не дают 100% гарантии.



МОНОГАМНЫЕ ОТНОШЕНИЯ СО ЗДОРОВЫМ ПАРТНЕРОМ

— это лучшее средство профилактики ИППП и возможность родить здоровых детей в будущем.

#Ты СИЛЬНЕЕ
МИНЗДРАВ
УТВЕРЖДАЕТ.

Источники данных: who.int, icln, vestny, guttmacher.org



ЗАЩИТА - ЭТО ПРОСТО

К УХУДШЕНИЮ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ МОГУТ ПРИВОДИТЬ:

- ▶ Раннее начало половой жизни.
- ▶ Смена половых партнеров.
- ▶ Аборты.
- ▶ Ранняя беременность.
- ▶ Неправильный подбор методов контрацепции.
- ▶ Употребление алкоголя увеличивает вероятность случайного секса и, как следствие, ИППП и незапланированной беременности.

ПРАВИЛА СОХРАНЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ОДИНАКОВЫ ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН:

- ▶ Знать того, кто с тобой рядом – не вступать в половой контакт с малознакомыми людьми, не заводить отношения на одну ночь.
- ▶ Предохраняться. При половом акте с непроверенным непостоянным партнером всегда использовать презерватив.
- ▶ С начала интимной жизни заботиться о контрацепции во избежание незапланированной беременности. Даже аборт, выполненный в условиях медицинского учреждения наносит вред здоровью женщины.
- ▶ Регулярно проходить осмотр у врача (акушера-гинеколога/ уролога). В случае развития инфекций, передающихся половым путем (ИППП) не заниматься самолечением.
- ▶ Нужна информация, связанная с репродуктивным здоровьем – не доверяй советам друзей и подруг, обратись за советом к врачу.

**8 800 200 0 200
TAKZDOROVO.RU**

УЗНАЙ БОЛЬШЕ О РЕПРОДУКТИВНОМ ЗДОРОВЬЕ ПО ТЕЛЕФОНУ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ В 800 200 0 200 ИЛИ НА САЙТЕ TAKZDOROVO.RU



ЗАЩИТА - ЭТО ПРОСТО

НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РАННЕЙ ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Беспорядочные половые связи в любом случае несут большой риск заразиться инфекциями, передающимися половым путем (ИППП).

Презервативы только снижают вероятность передачи ИППП, но не гарантируют защиту от них.

К ИППП относят не только венерические болезни, такие как сифилис и гонорея, но и ВИЧ, СПИД, вирусные гепатиты В и С, генитальный герпес, уреаплазмоз и микоплазмоз, хламидиоз, цитомегаловирус, вирус папилломы человека (ВПЧ).

Многие из заболеваний, передающихся половым путем, протекают бессимптомно.

Наибольшая угроза заразиться ИППП возникает при частой смене партнеров.

В результате этого стресса:

- ▶ Отмечаются перепады в настроении, склонность к постоянным сомнениям, самобичевательным реакциям, пониженное самоуважение, а также чрезмерная чувствительность, развиваются комплексы.
- ▶ Возникает повышенная тревожность, раздражительность, чувство усталости, вялость, апатия.
- ▶ Возникают подростковые депрессии, которые могут привести к суициду (девушки, вступившие в сексуальные контакты в подростковом возрасте, совершают самоубийства в 3 раза чаще, чем их ровесницы).
- ▶ Развивается неспособность построения гармоничных отношений.

Прочие негативные последствия ИППП:

- ▶ Развитие бесплодия в результате хронического воспалительного процесса половых органов.
- ▶ Эрозия шейки матки, которая в дальнейшем может вызвать рак шейки матки.

Природу не обманешь. В результате сексуальных отношений в любом случае может произойти зачатие ребенка.

Доказано, что интенсивная половая жизнь в молодом возрасте своими последствиями имеет преждевременное прекращение половой активности в зрелом возрасте.

Чтобы заразиться, достаточно одного полового контакта

ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРВОГО АБОРТА

1. 25% женщин после первого аборта отмечают большие трудности с зачатием, могут стать бесплодными.
2. высокий риск инфекционных осложнений после абортов, которые приводят к хроническим воспалительным процессам в женской репродуктивной системе и как следствие – к бесплодию.
3. некоторые женщины в дальнейшем испытывают страх близости, развивается фригидность;
4. повышается риск заболевания раком молочной железы.

**8 800 200 0 200
TAKZDOROVO.RU**

УЗНАЙ ВСЕ О РЕПРОДУКТИВНОМ ЗДОРОВЬЕ ПО ТЕЛЕФОНУ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ В 800 200 0 200 ИЛИ НА САЙТЕ TAKZDOROVO.RU